

Peer: Bruine krikpeer



Vruchtvorm	Redelijk variabel, van duidelijk tolvormig tot bijna klokvormig. De meeste zijn kelkbuikig, enkele neigen naar middenbuikig.
Vruchtgrootte	Kleine tot middelgrote vruchten: 45 – 50 mm breed, 70 – 90 mm hoog. Massa van de meeste vruchten tussen 80 en 120 g.
Schil	Droog en glad aanvoelend. Grondkleur bleekgroen met talrijke bruine stipjes, groenbruine roest in beperkte mate aanwezig. Opvallende oranje-rode bloes, licht gestreept naar kelkzijde, met ook hier veel bruine tot groene stipjes.
Vruchtvlees (geur, smaak)	Aangename geur. Wit vruchtvlees met groene toetsen onder de schil, matig bruin verkleurend. Vrij knapperige en sappige peer met eerder neutrale smaak. Weinig aromatisch, zoet-zuur. 'Allemansvriend'.
Steel & kelk	Vrij korte, dikke, vlezige, donkergroene tot bruine steel. Steelholte soms licht verzonken, met duidelijke knobbels aan de rand. Doorgaans min of meer rechtop ingeplant, soms scheef en beperkt zijdelings gezwollen. Kelkholte nagenoeg vlak, met halfopen kelk. Kelkblaadjes breed en spits.

Boomkenmerken	Eenjarige twijgen fors, groen tot roodbruin met verspreid kleine, langwerpige, beige tot licht roodbruine lenticellen. Amper dons. Bladsteel eerder kort, onderzijde bleekgroen, bovenzijde vaak roze aangelopen. Bladschede groen. Bladeren eivormig met spitse top. Bladrand bijna gekarteld. Bovenzijde blad intens glanzend groen, onderzijde bleker en vrij grof gemaasd.
Oogsttijd	Vroege zomerpeer, rijpt doorgaans vanaf 3 ^{de} week juli.
Gebruik / Bewaring	Net als bij andere vroege perenrassen komt het erop aan om het juiste pluktijdspip goed af te toetsen door regelmatig te controleren. Te laat geplukte vruchten boeten snel in aan kwaliteit. Niet te bewaren. Goede eet- en dessertpeer, ook geschikt om te stoven. Toe te voegen bij de eerste appels voor een eerste persing van sap.
Herkomst	Volgens 'Bulletin d'arboriculture, de culture potagère et de floriculture 1878' ontstaan als een zaailing bij een 'bescheiden boomkweker', Charles (Karel) Finet in Sleidinge, wonende in de wijk Schoonbroek. De boom moet voor 1763 ontstaan zijn want de kweker overleed in 1762. Ten tijde van het artikel was volgens de auteur de boom ongeveer 100 jaar oud. Andere bronnen situeren de wijk Schoonbroek te Antwerpen, maar dit lijkt ons niet correct. Kende een beperkte verspreiding in Oost-Vlaanderen. Is nog vrij courant verkrijgbaar bij de boomkweker.
Naamgeving	Verwijzend naar het uiterlijk.

