

Peer: Cooremanspeer



Vruchtvorm	<p>Enigszins variabel, maar doorgaans flesvormige peren, duidelijk kelkbuikig. Top eerder smal, vaak min of meer plateauvormig.</p>
Vruchtgrootte	<p>Eerder kleine peer, meeste vruchten tussen 45 en 50 mm breed en 60 – 70 mm hoog. Massa 55 à 95 g.</p>
Schil	<p>Droge, matig ruwe schil (glad aan bloskant). Grondkleur friskgroen met een waaier aan decoratie: donkere stipjes, karmijnrood blosje met bleekgroene stipjes, onregelmatige bruingroene roest (kan erg verschillen van peer tot peer). Indien rijp zowat oranje verkleurend, bij massale dracht dan een opvallende verschijning in het landschap.</p>
Vruchtvlees (geur, smaak)	<p>Indien nog niet volledig rijp, Conférence-achtige geur. Dan ook nog krakend, sappig en aromatisch. Echter zeer snel melig.</p>
Steel & kelk	<p>Middellange tot lange, groenbruine steel (aan basis soms volledig groen), smalst in het midden, met vleesknop overgaand in de vrucht, schuin ingeplant. Vleesknop en steel met ribbels en bobbels. Open tot gesloten kelk, meestal niet of nauwelijks verzonken en met geen of zwakke knobbels. Meestal brede, korte, spitse kelkblaadjes.</p>

Boomkenmerken	Eenjarige twijgen bruingroen, opvallend donzig aan de top. Ruitvormige tot langwerpige lenticellen regelmatig verspreid (duidelijk minder in bovenste helft), bruin gekleurd. Bladeren gemiddeld tot groot, rond of eivormig met spitse top. Bladsteel middellang tot lang, zeer bleekgroen, bladschede niet of weinig rood aangelopen. Bovenzijde blad donkergroen, glanzend. Onderzijde grauwer, bladadertjes opvallend 'fijnmazig'. Bladrand bij veel bladeren bijna gaaf. Boom kan overvloedig vruchten dragen en is dan vanop afstand herkenbaar. Minder gevoelig voor wormstekigheid.
Oogsttijdstip	Vroege peer, doorgaans rijpend ergens halverwege de zomervakantie.
Gebruik / Bewaring	Vooral als eetpeertje te gebruiken, wegens bijzonder snel buikziek. Pluktijdstip moet precies goed zitten (moet nog knapperig zijn), elke dag eens gaan checken is dus de boodschap. Best niet aanplanten indien men in deze periode zijn jaarlijkse vakantie plant. Eenmaal rijp, volstrekt niet te bewaren.
Herkomst	Zou vernoemd zijn naar een zekere heer Cooreman, verdere gegevens ontbreken.
Naamgeving	Volgens een verslag uit 1921 van de <i>Pomologische Vereniging</i> 'Cooremanspeer' geheten, vernoemd naar naam van de winner. In de Denderstreek is dit peertje echter veel beter gekend onder de naam 'Cooremannekes' en hier zeer algemeen verspreid. Citaat wijlen Rie van Pol (cafébaas uit Mollem): <i>een boerderij was die naam niet waardig als er geen Cooremannekes stond</i> . Lijkt buiten de regio veel minder verspreid. Valt ook niet (meer) te krijgen bij de boomkwekerij.





Overvloedige dracht van Cooremanspeer, hier volledig rijp en reeds oranje verkleurend.