


## Peer: Tardive de Ninove



<b>Vruchtvorm</b>	Vrij regelmatige, licht asymmetrische, kort tolvormige peren. Doorsnede enigszins bultig.
<b>Vruchtgrootte</b>	Gedrongen maar potige vruchten. 65 à 85 mm hoog, 75 à 85 mm breed. Massa 210 – 310 g.
<b>Schil</b>	Vrij gladde schil, grondkleur groen tot geelgroen bij volle rijpheid. Sommige vruchten met mooie rode blos, bij andere blijft dit beperkt tot een donkerdere, roestige zone. De mate waarin de vruchten al of niet blos vertonen, lijkt volgens onze waarnemingen soms aan de onderstam gerelateerd. Bezaaid met bronskleurige tot zelfs roodachtige schilstippen. Onaangenaam bij eten.
<b>Vruchtvlees (geur, smaak)</b>	Witachtig vruchtvlees, krakend en sappig. In de herfst nog redelijk wrang.
<b>Steel &amp; kelk</b>	Gemiddeld lange, matig dikke, bruine steel met enkele bleke, ronde tot ovale kurklijsten. Ontspringt scheef uit het vruchtmidden. Licht verzonken steelholte, in meer of mindere mate bultig afgeboord. Gesloten tot halfopen kelk in matig diepe, gelijkmatig versmallende kelkholte.

<b>Boomkenmerken</b>	Nog niet beschreven.
<b>Oogsttijdstip</b>	Plukken vanaf november. Pas eetrijp na nieuwjaar (februari).
<b>Gebruik / Bewaring</b>	Mooi gekleurde (zonnekant) roodbruine stoofpeer, zeker te bewaren tot in maart of zelfs juni.
<b>Herkomst</b>	'Tardive de Ninove': beschreven in 1897 in het "Bulletin d'arboriculture" met afbeelding. Ontstaan in Ninove bij dhr. De Deyn, burgemeester, uit de stronk van een perenboom die door de strenge winter afgestorven was. Volgens dhr. De Deyn was dat een zaailing uitgeplant in 1860 als mogelijke onderstam maar de vrucht was waardevol (1867 of 1868 eerste vrucht) en werd in Brussel in 1870 voorgesteld bij de Société d'arboriculture.
<b>Naamgeving</b>	Naar het tijdstip van rijpen en de locatie.



Project fruitvondelingen Dender- en Scheldestreek